DANCESAFE

КАК ТЕСТИРОВАТЬ ВАШИ ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВАМИ

РЕАКТИВЫ

Реактивы — это химические реактивы для тестов, , которые, при контакте с определёнными классами ПАВ, меняют цвет, подтверждая (или исключая) наличие вещества и его тип, часто используются для экспресс-анализа и идентификации наркотиков в порошках или растительном материале.

TNS	Simon's Color Reaction Time 0-30 Seconds / 30-180 Sec
MDMA	
MDE	
MDA	No Reaction
Aspirin	
PMMA	
PMA	No Reaction
Fexofenadine	
Doxylamine	
Methedrone	
Ethylone	
Methylone	
Levamisole	No Reaction
Naproxen	
Guaifenesin	
Meth	

DanceSafe — это первый и единственный в США некоммерческий производитель наборов реагентов. Все доходы помогают нам предоставлять бесплатные услуги по охране здоровья и обеспечению безопасности, включая бесплатную проверку на наркотики, на мероприятиях по всей стране.

DanceSafe

dancesafe.org/testing-kit-instructions

1 **НАЧНИТЕ с прочтения этой инструкции “Как использовать реактивы”**

2 **ДАЛЕЕ, просмотрите брошюру, чтобы найти цветовую шкалу для тестирования конкретного наркотика (наркотиков), который (какие) у вас есть.**

- Если вы тестируете MDMA, MDA, амфетамин, метамфетамин, кетамин, LSD или кокаин, обратитесь к разделам «КАК ТЕСТИРОВАТЬ» в брошюре.
- Если вы тестируете другой наркотик, обратитесь к цветовой шкале в конце инструкции. Помните, что реагенты никогда не могут определить фентанил. Это может сделать только тест-полоска для определения фентанила или лабораторное оборудование.

3 **ДАЛЕЕ, протестируйте вещество, используя инструкции в разделе «КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕАКТИВЫ»**

Сравните ваши цветовые реакции с цветовой шкалой для тестируемого вещества.

Не уверены в своей реакции? Попробуйте:

- Повторное тестирование с большим образцом препарата.
- Убедитесь, что ваша тестовая поверхность полностью чистая, сухая, белая и непористая (керамика, фарфор, твердый пластик)
- Используйте «пустой образец», поместив каплю реагента без вещества рядом с тестовым образцом, чтобы сравнить цвета.

4 **ВОПРОСЫ? См. FAQ**

ЧТО ТАКОЕ РЕАКТИВЫ?

Реактивы — это химические вещества, которые меняют цвет при контакте с определенными препаратами. В этой брошюре указаны ожидаемые цвета реакций для некоторых наиболее распространенных наркотических веществ, представленных на рынке. Реакции реагентов называются «ожидаемыми» или «неожиданными».

Если у вас большой опыт, вы можете получить много информации из результатов ваших тестов, но важно проявлять **осторожность** и **помнить, что только лаборатория может подтвердить состав ваших наркотиков.**

✓РЕАКТИВЫ МОГУТ...

- Сообщить вам, что состав ваших препаратов может отличаться от ожидаемого («ред флаги»).
- Предоставить информацию о возможном общем составе ваших препаратов.
- Поможет вам принять решение о том, как или следует ли вам употреблять ваши препараты.

✗РЕАКТИВЫ НЕ МОГУТ...

- Они НЕ покажут вам, насколько сильнодействующие ваши наркотики
- НЕ покажут, насколько чистые ваши наркотики
- НЕ покажут точно какие именно вещества, если в вашем образце присутствует несколько веществ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕАКТИВЫ

⚠ ВНИМАНИЕ! **ЭТОТ ПРОДУКТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКОКОРРОЗИОННЫМ И/ИЛИ ТОКСИЧНЫМ.**

При попадании на кожу немедленно промойте водой. При попадании в глаза, промывайте глаза водой не менее 10 минут, держа их открытыми. При случайном проглатывании промойте рот. Не вызывайте рвоту. Выпейте воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ВАМ ПОНАДОБИТЬСЯ



Наркотики

Реактивы

Белая поверхность (керамика, фарфор)

Перчатки (реагенты едкие!)

Вода

(для промывания пластины)

Пищевая сода

(для нейтрализации реактивов во время уборки – полезно, но вы можете промыть поверхность для тестирования водой и вымыть мылом, если у вас нет пищевой соды под рукой)

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

- **Использование загрязненной поверхности для тестирования**
- **Использование не белой поверхности для тестирования**
- **Использование двухкомпонентных реактивов на двух разных образцах***

***** Двухкомпонентные реактивы следует использовать на одном и том же образце:

образец + бутылка А + бутылка В

- **Надевание крышки реактива на неправильную бутылку или на загрязненную поверхность***

***** Может загрязнить всю бутылку

- **Использование просроченного реактива***

***** Если вы не можете четко увидеть реакцию при использовании тестовой капли на сахаре, или если жидкость очень темная, реакция может быть нечитаемой или неточной.

ШАГ 1 Соберите образец ваших наркотиков.

Размер образца:

Булавка (для приблизительного размера)

Порошки и таблетки

Блоттер (марка)

Маленький уголок

Жидкое вещество. Одна капля.

- Измельчите образец до мелкого состояния.
- Примечание: Если вы используете реагент Морриса, удвойте размер образца.

ШАГ 2 Используйте реактив(ы).

1 **Откройте флакон с реактивом.**

Держите крышку вверх дном в другой руке. *

*Надевание крышки на поверхность или на неправильную бутылку может привести к загрязнению реагента.

2 **Добавьте одну каплю реактива в образец.**

Не прикасайтесь флаконом к образцу.

3 **Двухкомпонентные реактивы** (Simon's, Morris, and Folin):

Реактив А
+
Реактив В
+
Образец

Только для Morris:

перемешайте образец зубочисткой или острым предметом в течение 20 секунд.

ШАГ 3 Читаем реакцию.

1 **Обратите внимание на изменение цвета.**

- Большинство реакций с реактивами точны в течение примерно 45-60 секунд.
- Реакции Morris точны в течение примерно 5 минут.
- Реакция Ehrlich может занять до 20 минут и точна в течение примерно часа.



2 **Сравните вашу реакцию с используемой вами цветовой шкалой.**

Несколько цветов могут быть «ожидаемыми» реакциями для данного вещества. Если ваш результат совпадает с каким-либо из показанных цветов, он считается «ожидаемым». Если цвет реакции не соответствует таблице, реакция считается «неожиданной». Вы можете узнать больше об ожидаемых и неожиданных реакциях на странице часто задаваемых вопросов и на веб-сайте DanceSafe.

ШАГ 4 Повторите.

Большинство веществ необходимо тестировать с помощью нескольких реактивов. Обратитесь к цветовой таблице для тестируемого лекарства, чтобы узнать, сколько реактивов рекомендуется использовать. При использовании нескольких реактивов закройте крышку первого реагента и повторите процесс со следующим реагентом. Используйте каждый раз новый образец.

ШАГ 5 Уборка.

Используйте пищевую соду для нейтрализации химических веществ, затем промойте тестовую поверхность мылом и водой. Тщательно высушите ее перед проведением дальнейших тестов.



ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Храните реагенты вдали от источников тепла и солнечного света, чтобы продлить срок их хранения. Холодильник идеально подходит.
  *перед использованием заранее вытащите их чтобы их температура поднялась до комнатной.
- Большинство реагентов обычно хранятся 1-2 года в холодильнике, дольше в морозильной камере.
- Манделин изначально имеет светло-оранжевый цвет и становится мутно-желтым через 3-4 недели. Это нормально. Обязательно встряхивайте бутылку перед каждым использованием.
- Другие реагенты постепенно темнеют со временем. Они считаются просроченными только тогда, когда жидкость в бутылке становится слишком темной, чтобы реакции были четко различимы.
- Иногда проверяйте ваши реактивы на пригодность тестами. *См. далее в теме

КАК ЧИТАТЬ РЕАКЦИИ

Прочитайте все реакции в одной строке. Если какая-либо из ваших реакций не соответствует цвету (цветам), показанному(ым) в этой строке, тест считается «неожиданным».



ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ VS. НЕОЖИДАННЫЕ РЕАКЦИИ

Вы не обнаружили никаких тревожных сигналов. Ваша цветовая реакция(и) соответствовали таблице для одного конкретного вещества. **Помните, что реагенты не могут сказать вам о чистоте или силе вещества и не могут подтвердить состав ваших наркотиков.**



Если ваш результат соответствует какому-либо из показанных цветов, он считается «ожидаемым».

Вы обнаружили тревожный сигнал. Одна или несколько ваших реакций не соответствуют цветовой шкале в одной строке. Ваши наркотики могут быть не тем, чем вы их считали, или существует неизвестный фактор, влияющий на ваши результаты.



Если ваш результат не соответствует показанным цветам, он считается «неожиданным».

КАК ПРОВЕРИТЬ АМФЕТАМИН или МЕТАМФЕТАМИН

ВНИМАТЕЛЬНО!

Многие таблетки, содержащие амфетамин, окрашены и/или содержат очень малые количества активного ингредиента.

Красители:
Оранжевые таблетки могут окрашивать реакцию в виде пятен или комков оранжевого цвета. Синие таблетки могут вызывать мутный коричневатый цвет из-за смешивания синего красителя с оранжевой реакцией.

Количество:
Таблетка, весящая всего 150 мг, может содержать только 10 мг фактического амфетамина/метамфетамина. Используйте больший размер образца, когда это возможно.

1. **Соберите 3 образца.**
   Измельчите образцы до мелкого состояния.
2. **Начните с реактива MARQUIS на образце 1.**
   И амфетамин, и метамфетамин становятся оранжевыми в присутствии реактива Marquis.
3. **Затем используйте реактив SIMON'S на образце 2.**
   Метамфетамин становится синим в присутствии реактива Simon's, в то время как амфетамин не реагирует. Реактив Simon's необходим для различения метамфетамина от амфетамина.
4. **Наконец, используйте тест FROEHDE на образце 3.**
   Тест Фрёде — это необязательный, но полезный, третий шаг, который предоставляет еще одну точку данных.

ВНИМАНИЕ!
Таблетки часто содержат краситель, который может затруднить считывание результатов реакции. Это пример отсутствия реакции Фрёде с оранжевой таблеткой.

ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА АМФЕТАМИНА ИЛИ МЕТАМФЕТАМИНА

	MARQUIS	SIMON'S (A / B)	FROEHDE
Амфетамин		NR	NR
Метамфетамин			NR

КАК ТЕСТИРОВАТЬ КОКАИН

Кокаин может вызывать широкий спектр реакций с реагентами. Из-за ограничений таких лабораторий, как DrugsData, мы не можем знать, связано ли это с неактивными добавками (например, пищевой содой) или с особенностями производства кокаина. Ожидаются любые из реакций, показанных для каждого реагента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Реактивы не могут надежно сказать вам, чем может быть разбавлен ваш кокаин.

1 **Соберите 3 образца.**
Измельчите образцы до мелкого состояния.
Увеличьте объем образца вдвое, если используете реактив Морриса.

2 **Начните с реактива MORRIS** (двухкомпонентный реагент) **на образце 1.**
Реактив Морриса становится ярко-синим в присутствии кокаина.
Не считывайте результаты реакции, пока не перемешаете A + B + образец в течение 20 секунд.

3 **Затем используйте реактив Marquis на образце 2.**
Кокаин может давать различные цвета при использовании реактива Маркиса. Ожидается любой цвет, от отсутствия реакции до насыщенного персикового.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разница невелика, но персиковый цвет не совпадает с ярко-оранжевым или красным цветом при использовании реагента Маркиса. Ярко-оранжевый или красный цвет может указывать на присутствие амфетамина, а не кокаина.

Ожидаемая реакция для кокаина.

Скорее всего Амфетамин.

4 **Наконец, используйте реактив Liebermann на образце 3.**
Кокаин также может давать различные цвета при использовании реактива Либермана. Ожидается любой оттенок от светло-желтого до оранжевого.

ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА КОКАИНА

	A MORRIS B	MARQUIS	LIEBERMANN
Кокаин			

ВНИМАНИЕ! По состоянию на начало 2024 года кокаин является одним из наиболее распространенных неопиоидных наркотиков, загрязненных фентанилом. По возможности используйте тест-полоску для определения фентанила на кокаине.

ЧТО НАСЧЕТ АМФЕТАМИНОВ И ПРИМЕСЕЙ?

Наше понимание того, как реактивы Marquis и Liebermann могут реагировать с кокаином, изменилось по мере изменения ситуации на рынке наркотиков. Более подробная информация по этой теме доступна по QR-коду справа.

КАК ТЕСТИРОВАТЬ LSD

Реактив Ehrlich's используется для определения класса наркотиков, называемых «индолами». Реактив Эрлиха следует использовать только для определения таких наркотиков, как ЛСД, псилоцибин и ДМТ.

1 **Соберите образец.**

2 **Используйте реактив Ehrlich's.**
Реакция может занять несколько минут. Будьте осторожны, чтобы не спутать реакцию с фиолетовым красителем на промокательной бумаге.

ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА ЛСД

	EHRLICH'S
ЛСД (или другие индолы)	

ПРИМЕЧАНИЕ: Другие реактивы также реагируют с ЛСД, но реактив Эрлиха является наиболее важным. Вы можете использовать основную цветовую таблицу для проведения дополнительных тестов, если хотите. Не так много распространенных наркотиков, которые становятся фиолетовыми при использовании реактива Эрлиха и имеют активную дозу, достаточно малую, чтобы поместиться на промокательной бумаге.

КАК ПРОВЕРИТЬ MDMA или MDA

Наркотики, продаваемые как «молли» или «экстази», должны содержать один основной ингредиент — молекулу, называемую MDMA. Наркотики, продаваемые как «салли», должны содержать молекулу, называемую MDA. Независимо от того, как называется тот или иной наркотик при продаже, имеет значение только то, какие молекулы он содержит.

1. **Соберите 3 образца.**
   Убедитесь, что ваши образцы мелко измельчены.
2. **Начните с MARQUIS на образце 1.**
   Marquis чернеет в присутствии MDMA или MDA. Вы также можете заметить легкий фиолетовый или коричневый оттенок, особенно по краям.
3. **Затем используйте SIMON'S на образце 2.**
   SIMON'S (двухкомпонентный реактив) Simon's становится синим в присутствии MDMA. В присутствии MDA он может либо 1) не реагировать, либо 2) приобрести мутный серо-зеленый цвет.
4. **Наконец, используйте тест FROEHDE на образце 3.**
   И MDMA, и MDA в присутствии теста Фрёде приобретают черный цвет с синеватым оттенком.

ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА MDMA или MDA

	MARQUIS	A SIMON'S B	FROEHDE
MDMA "Molly/Ecstasy"			
MDA "Sass"		NR	

КАК ТЕСТИРОВАТЬ КЕТАМИН

Хотя тест Морриса является стандартным однокомпонентным тестом для определения кетамина, для сбора дополнительных данных может быть полезно также использовать тест Либермана.

1. **Соберите образец.**
   (или два, если вы также используете реактив Либермана). Мелко измельчите образец. Удвойте размер образца при использовании реактива Морриса.
2. **Начните с реагента MORRIS** (двухкомпонентный реактив)
   Не забудьте перемешать A и B в течение 20 секунд. Реагент Морриса обычно становится фиолетовым в присутствии кетамина. Однако точный оттенок может варьироваться и может иметь более «сине-фиолетовые» тона. Мы не уверены, что вызывает это изменение.
3. **Если есть возможность, используйте реагент LIEBERMANN**
   Кетамин становится очень, очень бледно-желтым (иногда настолько бледным, что его трудно разглядеть) при использовании реагента Либермана.

ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ КЕТАМИНА

	A MORRIS B	LIEBERMANN
Кетамин		

ЗАМЕТКИ О ДРУГИХ ДИССОЦИАТИВАХ

Рынок новых диссоциативов постоянно развивается. Хотя два препарата, DCK и 2-FDCK, имеют различные цветовые реакции по Моррису, в последние несколько лет они стали очень редкими. Возможно, их место заняли другие диссоциативы с неизвестными реакциями по Моррису. Мы подтвердили, что следующие диссоциативы не реагируют с реактивом Морриса:

- phencyclidine (PCP)
- deschloro-n-ethyl-ketamine (2-Oxo-PCE)
- 3-methoxy-PCP (3-MeO-PCP)
- 3-chloro-PCP (3-Cl-PCP)
- 3-methoxy-PCE (3-MeO-PCE)
- 2-oxo-PCE (O-PCE)
- methoxpropamine (MXPr)
- methoxetamine (MXE)
- ephenidine (EPE)
- diphenidine (DPD)

ЦВЕТОВАЯ ТАБЛИЦА ОЖИДАЕМЫХ РЕАКЦИЙ

Version 17, Spring 2024

Большинство реакций остаются точными примерно 45 секунд.

- **Реакция** Ehrlich's может длиться до 5 минут.
- **Результаты реакции** Ehrlich's могут оставаться точными до часа.
  *В идеале, результаты следует считывать в течение 20 минут.
- **Результаты реакции** Morris обычно точны как минимум 5 минут.

Номера (1, 2, 3 и т. д.) рядом с реакцией
Рекомендуемый порядок использования реактивов. Если реактив не обозначен номером, он считается менее важным для данного теста.

NR/ NO REACTION Реактив не меняет цвет с веществом.

НЕИЗВЕСТНО Доступно слишком мало данных, чтобы определить цвет реакции, или реакции изменились.

НЕПОСТОЯННО Цвета реакций обычно непостоянны между тестами.

СОВЕТ:
Используйте «пустой образец» или каплю
реагента отдельно, чтобы сравнить естественный цвет реагента
с цветом вашей реакции.
Большинство реагентов окрашены и могут менять цвет со временем.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

	MARQUIS	SIMON'S A	SIMON'S B	FROEHDE	LIEBERMANN	MORRIS A	MORRIS B	EHRLICH'S	MANDELIN	MECKE	FOLIN A	FOLIN B
						Для Morris удвойте объем образца. Перемешивайте смесь реагента и образца в течение 20 секунд.		В случае с Ehrlich's окончательный фиолетовый цвет может появиться через пять минут.				
MDMA "Molly/Ecstasy"	1	2		3		NR		NR			НЕИЗВЕСТНО	
MDA "Sass"	1	2	NR	3		NR		NR			НЕИЗВЕСТНО	
Метамфетамин	1	2		3	NR	NR		NR		NR	NR	
Амфетамин	1	2	NR	3	NR	NR		NR	NR	NR	НЕИЗВЕСТНО	
Cocaine	2	NR		NR	3	1		NR	NR	NR	NR	
Кетамин	NR	NR		NR		1		NR	NR	NR	NR	
2C-B	1	НЕПОСТОЯННО		2	3	НЕИЗВЕСТНО		НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	
2C-I	1	NR		2	3	НЕИЗВЕСТНО		NR	NR	NR	NR	
Мескалин	1	NR		2	3	NR		NR			NR	
LSD		NR				NR		1	NR	NR	NR	
Оксикодон	1	НЕИЗВЕСТНО		3	2	NR		НЕИЗВЕСТНО	NR		НЕИЗВЕСТНО	
Героин	1	NR		2	3	NR		NR			NR	
DMT	В настоящее время мы проверяем реакции реагентов DMT. Эта строка будет обновлена в следующей версии данной инструкции.											
Сахар						NR		NR			NR	

МЕНЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Мы рекомендуем обращаться к этому разделу только в том случае, если вы приобрели одно из этих веществ преднамеренно. В настоящее время эти препараты не распространены на рынке, и мы все еще работаем над подтверждением точности данных о цветовых реакциях.

5-APB / 6-APB		NR			NR	NR				
5-MAPB / 6-MAPB					NR	NR				
DCK/2-FDCK	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО		НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	НЕИЗВЕСТНО	
Mephedrone 4-MMC	NR		NR		NR	NR		NR	NR	
PMMA	NR				NR	NR		NR		

НЕ НАШЛИ НУЖНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ?

На нелегальном рынке существуют тысячи наркотиков. Эта таблица представляет наркотики, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на американском рынке наркотиков на момент последнего обновления брошюры, и не идеально подходит для тестирования новых веществ. Постоянное обновление информации о цветовых реакциях новых наркотиков — это трудоемкий процесс, поэтому мы включили в таблицу только те реакции, в достоверности которых мы уверены. Вы можете найти результаты анализа реагентов для других наркотиков в интернете. См. раздел часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации.

©2024 DanceSafe, Inc. All Rights Reserved.
Licensing and Permissions: permission@dancesafe.org

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Могут ли реагенты обнаружить все вещества?
Нет. Реактивы не реагируют с некоторыми наркотиками или могут реагировать непоследовательно в зависимости от способа производства вещества. Мы не знаем реакций для каждого вещества. Реакции также могут меняться в зависимости от способа производства, разбавления или упаковки.

Могут ли реагенты показать, насколько чисты или сильнодействующие ваши наркотики?
Нет. По состоянию на весну 2024 года нам неизвестно ни об одном легальном наборе для проверки чистоты, доступном для покупки в домашних условиях, и единственный способ получить «количественную оценку» (узнать, сколько конкретного наркотика содержится в вашем образце) — это воспользоваться услугами лабораторий.

Можно ли с помощью реагентов определить наличие нескольких наркотических веществ в вашем образце?
Не всегда. Даже если вы получите ожидаемые цветовые реакции для нужного вам вещества, в образце всё равно может присутствовать один или несколько других веществ. Это может быть связано с:
1. Не все вещества меняют цвет под воздействием реактивов.
2. Более темные цвета могут затмевать более светлые.
3. Очень маленькое количество вещества может не дать никакого эффекта.

КАННАБИС

Можно ли проверить марихуану с помощью реактивов?
В настоящее время нам неизвестны какие-либо эффективные или полезные методы тестирования каннабиса с помощью реактивов.

ГРИБЫ

Можно ли проверить грибы с помощью реагентов?
Технически да, но определить реакцию может быть очень сложно. Измельчите немного грибов и нанесите каплю раствора Эрлиха на образец (размером примерно с булавочную головку). Ищите фиолетовую реакцию. Поскольку грибы — это плотный органический материал, реакция может быть мутной и коричневой, или вообще невидимой.

Бензодиазепины

Можно ли проверить бензодиазепины (например, Ксанакс) с помощью реактивов? Нет. Большинство бензодиазепинов не реагируют с большинством или всеми реагентами. В крайнем случае, вы можете использовать реактивы, чтобы проверить, реагируют ли ваши бензодиазепины (что, как правило, недопустимо). Имейте в виду, что это не безупречный метод. Лабораторный анализ идеально подходит для проверки бензодиазепинов.

Статья-объяснение | Онлайн инструкция | База данных реакций

MDMA / MDA

Почему моя реакция Marquis больше фиолетовая, чем чёрная?
Возможно, вы использовали слишком маленький образец. Это всё ещё ожидаемая реакция, но если вы используете больший образец, вы, вероятно, получите более тёмный цвет, потому что реакция будет более концентрированной.

Почему для MDA указаны две реакции?

MDA может либо не реагировать, либо приобретать мутный серо-зеленый цвет при взаимодействии с реактивом Simon's. Мы не уверены, почему это начало происходить в 2021 году, но обе реакции ожидаемы для вещества, подобного MDA.

LSD

Что делать, если я тестирую гелевые таблетки ЛСД?

Поскольку гелевые таблетки намного плотнее обычной промокательной бумаги (марки), реакция может занять гораздо больше времени для считывания результатов или быть едва заметной. Имейте в виду, что результаты могут быть трудночитаемыми.

Что делать, если моя марка или гелевая таблетка фиолетово-синяя?

Краситель из промокательной бумаги и гелевых таблеток может затруднить определение того, вызвана ли фиолетовая реакция красителем в таблетке. На этот вопрос нет идеального ответа, кроме как: найти очевидный фиолетовый цвет, который постепенно окрашивает всю каплю реагента, что может занять до 20 минут.

Можно ли тестировать жидкий ЛСД?

Да, но иногда ЛСД разбавляют веществами, которые могут повлиять на цвет теста, например, некоторыми темными спиртными напитками или напитками. Вода, физиологический раствор и простые прозрачные спирты, например, водка, должны быть подходящими для тестирования.

КОКАИН

Что делать, если моя реакция Marquis приобретает ярко-оранжевый или насыщенный оранжевый цвет?

Если у вас возникают трудности интерпретации с помощью таблиц и дополнительной таблицы для кокаина, то вы можете отправить свою реакцию на сабреддит *ссылка в теме. Что бы другие пользователи помогли вам интерпретировать их.
ТАК ЖЕ
Вы можете попробовать прислать фотографию (она должна быть сделана в течение 45 секунд после реакции) на testit@dancesafe.org.

Я не знаю, совпадает ли моя реакция Morris с реакцией по методу Morris.

Реакция Морриса с кокаином должна приобретать ярко-синий цвет, например как конфета, «blue raspberry Jolly Rancher». Если вы не уверены в своей реакции, всегда пробуйте еще раз с большей пробой. Реакция Морриса может иметь «зеленый цвет морской пены», который может добавить зеленоватый оттенок, если размер пробы слишком мал.

КЕТАМИН

Достаточно ли фиолетовый цвет у моей реакции Morris?

Если вы не уверены в том, как интерпретировать свою реакцию, всегда пробуйте еще раз с большей пробой, если это возможно. Отсутствие реакции Морриса означает цвет «зеленой морской пены». Если размер вашей пробы слишком мал, зеленоватый оттенок отсутствия реакции может смешаться с фиолетовым оттенком реакции, из-за чего цвет может показаться немного странным. Чтобы реакция Морриса считалась неожиданной для кетамина, цвет должен явно выходить за рамки фиолетового (например, сланцево-синий цвет не ожидается для кетамина).